Tegaderm Ag Mesh
Apósito con Plata Iónica
Ficha Técnica

Descripción

El apósito con plata 3M Tegaderm Ag Mesh es un apósito no tejido que contiene sulfato de plata en concentración de 8 mg/g de apósito. El sulfato de plata se libera como iones de plata y crea una barrera antimicrobiana eficaz contra virus, bacterias y hongos que dura hasta 7 días. El apósito es suave y absorbente, estéril y puede cortarse a medida. Su estructura no oclusiva y porosa, se adapta a la base de la herida.

Usos

Bajo la supervisión de un profesional de la salud, este apósito se puede usar como apósito primario sobre Abrasiones, Ulceras (venosa, arterial, diabética neuropática), Heridas traumáticas, Heridas quirúrgicas, Zonas donadoras de injerto, Quemaduras de primer y segundo grado.
Para heridas infectadas seguir protocolos locales (generalmente indicado cambio cada 24 horas durante las primeras 72 horas).

Modo de Empleo

Siga el protocolo clínico para la prevención y control de las infecciones de su institución.

Si va a usar un apósito adhesivo secundario, recorte el vello alrededor de la herida.

Limpie la herida y la piel circundante.

Si la piel alrededor de la herida tiende a dañarse fácilmente o si se espera que el exudado rebasará los bordes de ésta, puede aplicarse un protector cutáneo barrera como la Película Protectora Sin Ardor 3M Cavilon.

Valore la herida y seleccione el tamaño del apósito de modo tal que cubra la herida hasta el borde de la misma, sin que se superponga sobre la piel circundante. El apósito puede cortarse para permitir este procedimiento.
Fije el apósito con una cobertura secundaria adecuada para ayudar a controlar el exudado y mantener la herida húmeda.
Para heridas secas o con escaso exudado, puede humedecer el apósito con solución salina normal estéril o agua estéril para otorgar un medio húmedo a la herida.
Para heridas con exudado moderado o abundante no es necesario humedecer el apósito.
Cambie el apósito cada vez que sea necesario. La frecuencia del cambio depende de muchos factores como el tipo de herida, la cantidad de exudado y los protocolos locales. El apósito mantiene su eficacia hasta por siete días.
Si al momento de cambiarlo, el apósito esta adherido a la superficie de la herida, satúrelo con solución salina normal estéril o agua estéril, deje que se ablande y retírelo cuidadosamente.
APLICACIÓN BAJO SUPERVISION MEDICA / CONSULTAS PROFESSIONAL SERVICE 3M

Precauciones

El apósito 3M Tegaderm Ag Mesh con sulfato de plata no se debe utilizar en personas con hipersensibilidad conocida a la plata o al algodón. Este producto no esta indicado para ser usado como esponja quirúrgica o en quemaduras de tercer grado.

Empaque u otras referencias

Código	Descripción Producto	Medidas	Empaque
90500	Tegaderm Ag Mesh	5 x 5 cm	5 unids / caja
90501	Tegaderm Ag Mesh	10 x 12,7 cm	5 unids / caja